

# tip doc

## 疥疮 ( 疥癬 )



中文

如何分辨疥疮 ( 疥癬 ) ?

皮肤上出现红斑且发痒，出现在手指或脚趾之间或温暖的皮肤褶皱之间，例如腋窝或生殖器区域。夜间盖上温暖的被子之后，瘙痒会更严重。



如果出现此类症状，则应就医。



医生会确认您的症状是否为疥疮：

联系人

必须告知所有与您有过密切身体接触的人。



此类人也须就医。



治疗情况参见背面。  
一般措施参见第 2 页。



## 如何治疗疥瘡？\*\*

医生开出一一种膏药。



患者需要沐浴、清洁和剪短指甲。



将膏药均匀涂抹于皮肤上，头部除外  
(适用于 4 岁以上患者)。

必须每隔 8 小时涂抹一次膏药，例如隔夜涂抹一次。用肥皂洗掉膏药。

7天后重复。

穿上干净衣物。



伊维菌素 (Scabioral®) 替代治疗：每公斤体重 1x1  
口服剂量 200 微克。7天后重复。




由医生复检治疗是否成功。




.....  
\* 该信息设计使用氯菊酯进行治疗 (例如：Infectoscab®, Nix™, Dermal Cream™, Elimite™)。针对其他药物 (例如苯甲酸苄酯 (Antiscabiosum®)) 需进行多次治疗。请务必遵照医生和包装说明书的指示。

一般卫生措施，



**50°C 10 分钟**




使用最低为 50°C 的水洗净所有与皮肤接触的物品（床上用品，衣服，毛巾）

或




使用密闭的塑料袋将此类物品存放 3 天且不得拿出使用

或



冷冻 2 小时

并



用吸尘器抽吸软体家具。

每天清洗 1 次。

